P7 1956

Tome XXXVIII REVUE DE MYCOLOGIE Fasc. 2 1973

Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire de Cryptogamie

Planches inédites de N. Patouillard

Troisième Cahier

Pl. 10 Ganoderma bavianum Pat.

Pl. 11 Ganoderma fornicatum (Fr.)
Ganoderma ochrolaccatum (Mtg.)

Pl. 12 Ganoderma nutans (Fr.)

Pl. 13 Ganoderma albocinctum Pat.

publiées avec le concours de la
Fondation Singer-Polignac

Paris

BIBL. DU MUSE PARIS

Source : MNHN, Paris

Planches originales de N. PATOUILLARD
Publiées par la REVUE DE MYCOLOGIE avec le concours de la FONDATION SINGER-POLIGNAC

Source : MNHN, Paris

zingorum Nees
Ganoderma Barianum Lat
—
Vallée de Lankok (Mr Barr)
Cochin
— Juillet 1888

Leg. Balansa

11 Juillet 1888

Pileus ad ambitum orbiculatus. Cingulum glabrum, rugulosum, pallide rubellum, zonatum, ultimum immarginatum, pars sterilis, margo incurvata, pallide ochracea vel nigrescens. Tubus brunneus, tomentosus glabrescens, ferrugineus, radicans, corpus. Sporae parvae colorosae.

BIBL MUSE P

Source : MNHN, Paris

GANODERMA FORNICATUM (Fr.)
GANODERMA OCHROLACCATUM (Mtg.)



Planches originales de N. PATOUILLARD

Publiées par la REVUE DE MYCOLOGIE avec le concours de la FONDATION SINGER-POLIGNAC

Source : MNHN, Paris

Ganoderma fornicatum Fr.
San Carlos de Rio Negro
3 x^bre 1855
Leg. A. Saccaze
—
24 avril 1889

Le type se trouve sous la base d'une grande bouse

Ganoderma subincrustatum Mtg
—
Mts Guyane
—
Herb. Mus. Paris
—
14 Janvier 1890

Source : MNHN, Paris

Planches originales de N. PATOUILLARD.

Publiées par la REVUE DE MYCOLOGIE avec le concours de la FONDATION SINGER-POLIGNAC

Source : MNHN, Paris

Ganoderma rutans Fr.
Nouvelle Guinée.
=
19 juin 1889
MC

Stipe brunâtre, chapeau à peu près lisse, rugueux et sillonné, zoné. Spore, foncée, verruqueuse, ovoïde, sans nœud.

Source : MNHN, Paris

Ganoderma albocinctum sp.n.
Congo
Leg. Lecomte 1893
7 oct. 94

Planches originales de N. PATOUILLARD

Publiées par la REVUE DE MYCOLOGIE avec le concours de la FONDATION SINGER-POLIGNAC

Source : MNHN, Paris

Ganoderma albocinctum sp.n.

Congo

Leg. Leconte 1893

7 oct. 94

Croûte terne ou en partie luisante, provenue, villosule brune sanguinée d'ocre au marginé de gris, concentriquement rouge, brune, rousse; sommet ou s'ouvre le pore d'laqué noirâtre. Pore ou Tube ne semblable au restant du chapeau. Zone blanche persistante et constante. Hyménium glauque blanchâtre, pores entiers, anguleux, très petits. Spores ?

Stipe tomenteux, terne, jaunâtre.

Source : MNHN, Paris

22 JANV. 1975

M

Source : MNHN, Paris